

PP BROMHEXINA 2

- SOLUCION ORAL al 2%
- Mucolítico, secretolítico y expectorante

FORMULA:

Cada 100 ml contienen:

Bromhexina(como HCl) 2 g
Vehículo c.s.p. 100 ml

USO EN:Aves y Porcinos.

INDICACIONES:

- PP BROMHEXINA 2 SOLUCIÓN ORAL está indicado por su acción mucolítica, secretolítica y expectorante, como un eficaz coadyuvante en la profilaxis y terapéutica de las enfermedades respiratorias agudas o crónicas que cursen con moco viscoso bronquial, en todas las especies animales.
- PP BROMHEXINA 2 SOLUCIÓN ORAL también está indicado en la profilaxis y terapéutica de las enfermedades respiratorias agudas o crónicas que cursen con moco denso, así como en trastornos infecciosos que cursen con moco viscoso y purulento.
- PP BROMHEXINA 2 SOLUCIÓN ORAL y sus grandes ventajas:
 - Fácil dilución, rápida y homogénea.
 - Dosis bajas al utilizar en agua de bebida.
 - Rápida absorción vía oral.
 - Óptima distribución en plasma.
 - Efectivo incremento de IgA secretora.
 - Eficiente acción mucociliar.
 - Activa secretolisis mucorreguladora.
 - Eficaz efecto expectorante.
 - Sedante de la tos y catarro.
 - Facilita la ventilación pulmonar.
 - Proporciona mayor capacidad respiratoria.
 - Optimiza la acción antibiótica.
 - Útil en reacciones posvacunales en aves.
 - Adecuado para el tratamiento de las infecciones uterinas.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION:

Vía de administración:

- ✓ Oral, diluido en agua de bebida.
- ✓ Por Aspersión
- ✓ Según indicación del Médico Veterinario: aplicación intrauterina

Dosis en Agua de bebida:

En general, con fines prácticos, administrar 400 ml por cada 1,000 litros de agua de bebida, o UN (01) litro de producto para 2,500 litros de agua de bebida. El período de tratamiento es durante 5 a 7 días continuos.

Dosis (Referencia 1,000 aves)		
0.6 mg Bromhexina / Kg pv aves menos de 10 semanas		
1 mg Bromhexina / kg pv aves más de 10 semanas		
Dosis de PP BROMHEXINA 2	Edades	Peso
para Aves	Semanas	Promedio
4.95 mL / 56 L agua	0 - 1	165 g
12 mL / 125 L agua	1 - 2	400 g
27 mL / 174 L agua	2 - 3	900 g
42 mL / 226 L agua	3 - 4	1,400 g
100 mL / 264 L agua	10 - más	2,000 g
Porcinos	1 mg Bromhexina / Kg pv	Lechones: 1.5 mL / 21á 65 días Cerdos: 4.5 mL / desde los 66 días

Dosis por Aspersión:

500 ml de **PP Bromhexina 2** diluidos en 15 L de agua, alcanzan para 150 m². Una aspersión al día durante 5 a 7 días.

Dosis para aplicación Intrauterina:

Diluir 7.5 ml. de **PP Bromhexina 2** por cada 100 ml. de solución salina estéril, mezclar con el antibiótico de elección y aplicar (bajo la consideración del Médico Veterinario).

Una vez preparada la mezcla administre de inmediato.

Periodo de retiro

Aves: 24 a 48 horas antes del sacrificio.

Cerdos: 5 días Antes del sacrificio

CONTRAINDICACIONES:

- ✓ No usar en aves de postura.

PRECAUCIONES:

- ✓ Mantener fuera del alcance de los niños.
- ✓ Agítese bien antes de usar
- ✓ No usar bebederos sucios ni oxidados.

ADVERTENCIAS:

- ✓ Consérvese en lugares frescos y secos no expuesto a la luz solar directa.
- ✓ Consulte al Médico Veterinario.

PRESENTACIONES:

Frasco con 1 lt.

Galón x1 Galón (equivalente a 3.785 litros).

Hecho en Perú por: Laboratorios Hofarm SAC

para [PRO PREMIX NUTRICIÓN SRL](#).

Responsable Técnico : MV Harold Zumaeta Naveros.

CMVP : 8461.

Jirón Los Canchis N° 162.

Urbanización San Juan Bautista de Villa- Chorrillos.

Teléfonos : 2540937- 2547770.

Lima- Perú.