

PROMICINA CORTICOIDE NF

Composición:

COMPONENTES	CANTIDAD
Dexametasona	0.5 mg/ml
Tianfenicol	30 mg/ml
Oxitetraciclina	50 mg/ml

Almacenar protegido de la luz a temperatura inferior a 25° C.

Indicaciones:

Aves: Enfermedades Respiratorias complicadas, Sinusitis, Bronquitis, Moquillo, Coriza infecciosa, Sinovitis, Colibacilosis, Complicaciones en brotes de New Castle y Viruela, Tifosis, Paratifosis.

Cerdos: Neumonía, Paratifosis, Complicaciones de Disentería Infecciosa, Septicemia.

Vacunos: Pleuroneumonía Bovina, Enfermedad del Transporte, Mastitis, Peritonitis, Tratamiento Pre y Post Quirúrgico, Infecciones Genito-Urinarias, Septicemia.

Administración y Dosificación: Intramuscular.

AVES	PROMICINA		PESO VIVO	
	1	ml	Por cada Kg.	
VACUNOS Y EQUINOS	2	a 5 ml	Hasta	50 Kg.
	5	a 10 ml	De 50 a	100 Kg.
	10	a 17 ml	De 100 a	250 Kg.
	17	a 20 ml	De 250 a	350 Kg.
	20	a 30 ml	Más de	350 Kg.
CERDOS Y LANARES	0.5	a 1 ml	Hasta	5 Kg.
	1	a 2 ml	De 5 a	10 Kg.
	2	a 4 ml	De 10 a	25 Kg.
	4	a 5 ml	De 25 a	50 Kg.
	5	a 9 ml	De 50 a	100 Kg.
	9	a 12 ml	Más de	100 Kg.

Período de Retiro:

No administrar a animales en períodos de gestación.

No tratar animales 21 días antes del sacrificio.

No destinar la leche para consumo humano antes de 6 días de la última aplicación.

Presentación:

Frasco x10 ml, x20 ml, x50 ml, x100 ml